

PRESEK

List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje

ISSN 0351-6652

Letnik **15** (1987/1988)

Številka 6

Strani 338–341

Boris Horvat:

MAGIČNI DODEKAEDER

Ključne besede: naloge, razvedrilo.

Elektronska verzija: <http://www.presek.si/15/915-Horvat.pdf>

© 1988 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

© 2010 DMFA – založništvo

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovoljeno.

MAGIČNI DODEKAEDER —nagradni natečaj iz 1. številke Preseka

V letošnji prvi številki Preseka smo objavili članek Kako nisva postala milijonarja. Boris Horvat in Miro Lozej v njem opisujeta svoje dogodivščine pri izumljanju "magičnega" dodekaedra, to je prostorske igračke, narejene po vzoru Rubikove kocke. Na nagradna vprašanja na koncu članka smo dobili samo dva odgovora — ali so bile nagrade premalo mikavne? Naloge sta rešila Peter Movrin in Sašo Dolenc, oba iz Ljubljane.

Sašo hodi v osmi razred osnovne šole in je odgovoril na vsa vprašanja, le prostornine sestavnih delov magičnega dodekaedra ni izračunal. V komentarjih je bil bolj redkobeseden in njegove izpeljave so bile še nekoliko okorne, zato pa tudi originalne. Posebno domiselno se je lotil izračuna prostornine dodekaedra, ki jo je dobil s seštevanjem in odštevanjem prostornine bolj enostavnih geometrijskih teles.

Peter (verjetno že srednješolec) je temeljito in elegantno izpeljal rešitve, dodal je tri nazorne skice in ni skoparil s komentarji. Majcena zamera bi bila samo, da ni ugotovil, da je pri prostornini dodekaedra izraz pod korenem popolni kvadrat. Objavljamo povzetek njegove rešitve, skupaj s skicami. Ker pravi, da "z izpeljavo enačbe za število robov in vogalov pa ne bomo odkrili Amerike", pa tudi objavljena je že bila v Preseku letnik 8, št. 3, bomo odgovorili samo na tretje in četrto vprašanje.

Za začetek iz slike 1 nastavimo zlati rez.

Iz podobnosti trikotnikov $\triangle ABC$ in $\triangle BDC$ sledi:

$$\frac{a}{d} = \frac{d-a}{a} \Rightarrow d = \frac{a(\sqrt{5}+1)}{2}$$


Višino x trapeza $ABEF$ izračunamo s Pitagorovim izrekom:

$$x^2 + \left(\frac{d-a}{2}\right)^2 = a^2 \Rightarrow x = \frac{a}{4} \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$$



Izračunamo še ploščino trikotnikov $\triangle BDA$ in $\triangle DCE$: $(d-a)x = ay$, ploščino trikotnika $\triangle AFC$ pa zapišemo na dva načina: $a(x+y) = dx$. Dobimo tale razmerja:

$$\frac{x}{y} = \frac{a}{d-a} = \frac{d}{a} = \frac{x+y}{x}$$

Slika 1



Slika 2



Slika 3

Zdaj lahko izračunamo polmere vseh treh krogel. Označimo jih s:

- K — polmer krogle, ki se dotika robov — $\overline{OD}$ na sliki 2,
 L — polmer včrtane krogle (dotika se ploskev) — $\overline{OE}$ na sliki 2,
 M — polmer krogle, ki gre skozi vogale (očrtane) — $\overline{OB}$ na sliki 2.
 Oglejmo si sliko 2.

Najprej nastavimo tale razmerja:

$$\frac{d}{2x} = \frac{K}{x+y} \Rightarrow K = \frac{a}{4}(3 + \sqrt{5})$$

Polmer dodekaedru včrtane krogle L izračunamo tako, da na dva načina zapišemo ploščino trikotnika $\triangle AOB$:

$$(x+y)L = K^2 \Rightarrow L = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{25 + 11\sqrt{5}}{10}}$$

Polmer dodekaedru očrtane krogle M pa je po Pitagorovem izreku:

$$M^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + K^2 \Rightarrow M = \frac{a}{4} \sqrt{6(3 + \sqrt{5})}$$

Prostornino vsakega pravilnega telesa lahko izrazimo kot vsoto prostornin n (n je število ploskev) pravilnih piramid, ki imajo za osnovo pravilni n -kotnik, za višino pa polmer pravilnemu telesu včrtane krogle. Imenujemo jih Juelove piramide. Ploščina pravilnega potkotnika p_5 je: (glej sliko 1); vsota ploščin romba $ABIF$, trikotnika CEF ter trikotnika BCI :

$$p_5 = ax + \frac{ax}{2} + \frac{(d-a)x}{2} \Rightarrow p_5 = \frac{a^2}{4} \sqrt{5 \cdot (5 + 2\sqrt{5})}$$

Prostornina dodekaedra pa je:

$$V_{12} = 12 \cdot \frac{p_5 L}{3} \Rightarrow V_{12} = \frac{a^3}{4} \sqrt{10(47 + 21\sqrt{5})} = \frac{a^3}{4} (15 + 7\sqrt{5})$$

Slika 3 je nemara sprta z zakoni projekcije, vendar iz nje lepo vidimo, kakšna sta vogalni in robni element. Vogalni je nekakšna poševna kocka, ki jo omejuje 6 enakih rombov, robni element pa lahko razpolovimo na dve enaki piramidi, ki imata za osnovno ploskev enakokraki trapez $ABCD$, za višino v_E pa enako višino kot vogalni element. Baza trapeza $AB = (d - a)$ je obenem rob malega dodekaedra v jedru, okrog katerega se vrtijo vsi gibljivi elementi. Zato je višina gibljive rezine, torej naših elementov, razlika med višinama Juelovih piramid velikega in malega dodekaedra. Pri tem je ξ sorazmernostni faktor.

$$v_E = a \cdot \xi - (d - a) \cdot \xi = \xi (2a - d)$$

$$v_E = \frac{a(3 - \sqrt{5})}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{25 + 11\sqrt{5}}{10}} \Rightarrow v_E = \frac{a}{20} \sqrt{10(5 + \sqrt{5})}$$

Prostornina robnega elementa je torej:

$$V_{rob} = 2 \cdot \frac{3(d - a) \cdot a \sqrt{10(5 + \sqrt{5})}}{4 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 20} \Rightarrow V_{rob} = \frac{a^3}{16}$$

Prostornina vogalnega elementa:

$$V_{vog} = \frac{a \cdot x \cdot a \sqrt{10(5 + \sqrt{5})}}{2 \cdot 2 \cdot 20}$$

Tokrat si lahko zoprn racionaliziranje prihranimo. Formula je enaka kot zgornja, le da namesto $(d - a)$ nastopa a . Razmerje obeh prostornin je zopet zlati rez, zato mirno zapišemo:

$$V_{vog} = \frac{a^3}{16} \cdot \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$$

In nagrade? Peter dobi magični dodekaeder, Sašo knjižno nagrado iz Presekova knjižnice. Oba reševalca – nagrajenca vabimo, da svoji nagradi prevzameta pri Komisiji za tisk DMFA – SRS, Jadranska c. 19, soba 316.

Boris Horvat